

Natura 2000

Généralités



Sommaire

- Origine de Natura 2000
- Textes fondateurs
- Réseau Natura 2000
- Terminologie
- Habitats et espèces en région Centre
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- Acteurs impliqués


- **Origine de Natura 2000**

- Textes fondateurs
- Réseau Natura 2000
- Terminologie
- Habitats et espèces en région Centre
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- Acteurs impliqués

Origines de Natura 2000

Constat : patrimoine naturel menacé, perte de la biodiversité

→ destruction et fragmentation des habitats naturels, pollution, surexploitation des ressources naturelles, introduction d'espèces, modification du climat...



Réponse de l'Europe : constituer le réseau Natura 2000

→ réseau de sites représentatif de la biodiversité européenne

Objectif : préserver la biodiversité tout en valorisant les territoires

→ conciliation préservation de la nature et préoccupations socio-économiques

- Origine de Natura 2000
- **Textes fondateurs**
- Réseau Natura 2000
- Terminologie
- Habitats et espèces en région Centre
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- Acteurs impliqués

Les textes fondateurs

Directive « Oiseaux » - 2 avril 1979



- Protéger les espèces d'oiseaux sauvages en Europe
- Création de ZPS (Zones de Protection Spéciale)
- annexe I : oiseaux d'intérêt communautaire pouvant justifier la désignation d'un site

Directive « Habitats – faune – flore » - 21 mai 1992



- Assurer la conservation des habitats naturels, la flore et la faune sauvages en Europe

- Création de ZSC (Zones Spéciales de Conservation)

- annexe I : habitats d'intérêt communautaire pouvant justifier la désignation d'un site



- annexe II : espèces d'intérêt communautaire pouvant justifier la désignation d'un site

L'Europe laisse aux États le soin de définir leur stratégie


- Chaque État est tenu à des **obligations de résultats**, mais **pas de moyens**.

- Origine de Natura 2000
- Textes fondateurs
- **Réseau Natura 2000**
- Terminologie
- Habitats et espèces en région Centre
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- Acteurs impliqués

Natura 2000 en Europe


22 000 sites Directive « Habitats »

5 000 sites Directive « Oiseaux »



Natura 2000 en France

Code de l'environnement : L 414-1 à 8 et R414-1 à 26



1740 sites en France

⇒ 1360 sites Directive
« Habitats »

⇒ 380 sites Directive « Oiseaux »

**6,9 millions ha terrestres
(12,5 % du territoire)**

⇒ 4,6 M ha Directive « Habitats »

⇒ 4,3 M ha Directive « Oiseaux »

→ volonté nationale de **gestion concertée et contractuelle** des sites Natura 2000

→ **partie réglementaire** (évaluation des incidences)

Natura 2000 en région Centre

59 sites

⇒ 41 sites Directive « Habitats »

⇒ 18 sites Directive « Oiseaux »

702 000 ha
(18 % du territoire)

⇒ 463 000 ha Directive
« Habitats » (11,5 %)

⇒ 358 000 ha Directive
« Oiseaux » (9 %)



- Origine de Natura 2000
- Textes fondateurs
- Réseau Natura 2000
- **Terminologie**
- Habitats et espèces en région Centre
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- Acteurs impliqués

Quelques définitions...

Habitat naturel : « zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi naturelles ».

Exemples : hêtraies à houx, prairies humides

Habitat d'espèce : « le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ».

Exemples : haies, arbres morts

Habitat naturel « d'intérêt communautaire » : en danger de disparition – aire de répartition réduite – particulièrement représentatif de la biodiversité européenne

Habitat naturel « prioritaire » * : « en danger et pour la conservation duquel la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de son aire de répartition naturelle comprise sur le territoire européen ».

Espèce « d'intérêt communautaire » : en danger de disparition – vulnérable – rare - endémique

Espèce « prioritaire » * : « en danger de disparition et pour la conservation de laquelle la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de son aire de répartition naturelle comprise sur le territoire européen ».

- Origine de Natura 2000
- Textes fondateurs
- Réseau Natura 2000
- Terminologie
- **Habitats et espèces en région Centre**
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- Acteurs impliqués

Les pelouses sèches




Les prairies



Les landes



Les forêts



Les rivières




Les mares et étangs



Les marais et les tourbières



Les oiseaux des plaines agricoles



Les chauve-souris



- Origine de Natura 2000
- Textes fondateurs
- Réseau Natura 2000
- Terminologie
- Habitats et espèces en région Centre
- **Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site**
- Acteurs impliqués

Une démarche concertée...

Création d'un comité de pilotage

- organe de **concertation** et de **débat** d'un site
- constitué pour chaque site
- présidé par un élu local ou le Préfet
- regroupe l'ensemble des acteurs concernés par le site




Rôle du comité de pilotage

- conduit l'**élaboration** du document d'objectifs
- suit la **mise en œuvre** du document d'objectifs (=animation)

Une démarche concertée...


Élaboration d'un document d'objectifs

- élaboré par un **opérateur** en lien avec le comité de pilotage



Le diagnostic écologique

Cartographie des habitats et des espèces :



Le diagnostic écologique

fiches « espèce » :

- code UE
- statut
- description
- localisation sur le site
- biologie
- menaces
- préconisations de gestion

Le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia* Rottenburg)

Ordre des Lépidoptères – Famille des Nymphalidae

• Code UE : 1052

• Statut

Protection nationale (arrêté du 22/07/1993)
Espèce de l'annexe II de la directive "Habitats, Faune, Flore"



• Description de l'espèce

Papillon mâle et femelle :

Desus des ailes rouge orangé et fauve jaunâtre, lacéré de lignes noires. Les ailes postérieures sont marquées de points noirs dans la bande submarginale rougeâtre. Les ailes antérieures présentent de petites taches jaunâtres dans la bande submarginale rouge.

Desous des ailes plus clair. Les points noirs localisés sur les ailes postérieures sont cerclés de jaune.

La femelle est plus grande que le mâle.
Envergure moyenne : 36 mm.

• Habitat

Pour l'écotype des zones sèches, le Damier de la succise fréquente les pelouses rases du *Microbromion* et *Xerobromion* (Code Corine : 34.32 et 34.33). Sur ces milieux elle est inféodée à la Scabieuse columbinaire (*Scabiosa columbaria*).

• Distribution

Le Damier de la succise est bien représenté dans le sud-ouest de la France et remonte jusqu'au nord-est de la France.

• Localisation sur le site

Le Damier de la Succise n'a pas fait l'objet de nouvelles observations depuis 1982, date de la dernière donnée. (observation du 15/05/1982 – L. LESUIRE).

• Biologie/cycle de développement

Le Damier de la Succise ne vole que par temps ensoleillé d'avril à juillet. L'accouplement très long (plus de 4 heures) est suivi quelques jours plus tard de la ponte. Les œufs sont alors déposés en paquets sur le dessous des feuilles de la Scabieuse. Les chenilles entrent en diapause dès la fin de l'été pour n'en ressortir qu'au printemps suivant. Il s'ensuit le stade de nymphose, toujours sur les feuilles de la plante hôte, qui dure environ 15 jours à trois semaines.

Le diagnostic écologique

Fiches « habitat » :


- code UE
- cortège floristique
- menaces
- orientations de gestion

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	
Code Corine : 34.32	Code Natura 2000 : 6210
Directive habitats : Prioritaire	
Localisation et description du groupement Ce groupement est présent sur l'ensemble des pentes des puits du Chinonais. Il correspond à une formation mésophile à méso-xérophile haute et dense, formée par des graminées vivaces et de nombreuses orchidées, sur sol profond (rendzine).	Rang phytosociologique Classe : Fectuco brometea (Braun-Blanquet et Tüxen 1943 em. Royer 1987). Ordre : Brometalia erecti (Braun-Blanquet, 1930) Alliance : Mesobromion
Cortège floristique caractéristique Brème érigée (<i>Bromus erectus</i>) Fétuque ovine (<i>Festuca ovina</i>) Hélandthème blanc (<i>Helianthemum apeninum</i>) Hippocrepide en ombelle (<i>Hippocrepis comosa</i>) Petite pimprenelle (<i>Sanguisorba minor</i>) Scabieuse colombaine (<i>Scabiosa columbaria</i>) Brachypode penné (<i>Brachypodium pinnatum</i>) Hélandthème jaune (<i>Helianthemum nummularium</i>) Ophrys abeille (<i>Ophrys apifera</i>) Ophrys sphegodes (<i>Ophrys aranifera</i>) Orchis morio (<i>Orchis bouffon</i>) Ophrys insectifera (<i>Ophrys mouche</i>) Himanthoglossum hircinum (<i>Orchis bouc</i>) Orchis singe (<i>Orchis simia</i>) Orchis pourpre (<i>Orchis purpurea</i>)	 Le puits Brouet - CRBC - B. 34.32
	Habitats en contact Habitats de l'annexe I : Pelouses du xerobromion (34.33) Pelouses pionnières médio-européennes (34.1)
Dynamique évolutive / menaces L'origine de ce groupement est liée à l'abandon ancien des pratiques agricoles (viticulture et maraîchage). Sur rendzines (sols relativement profonds), le mesobromion constitue la formation herbacée qui prédomine sur les plus anciennes pelouses des puits. Elle évolue rapidement vers des ourlets herbaux puis arborescents et semble, par endroits, appauvrie par le brachypode.	
Orientations de gestion et de suivi - Fauche ponctuelle compte tenu de la dynamique évolutive lente de cette formation – privilégier une rotation de fauche centrifuge sur deux ans minimum – limitation des phénomènes d'ourfification (débroussaillage raisonné) - Sensibiliser le public au respect de quelques règles simples (interdiction de dépôts d'ordures, respect des sentiers, pas de cueillette, pas de pique-nique...) : mise en place d'une signalétique d'information, de sorties découvertes, et aménagement d'air d'accueil et de canalisation du public... - Assurer le suivi botanique des pelouses et le suivi de l'entomofaune remarquable (<i>Maculinea arion</i>...)	

Une démarche concertée...

Élaboration d'un document d'objectifs


- élaboré par un **opérateur** en lien avec le comité de pilotage



...basée sur le volontariat

Mise en oeuvre du document d'objectifs

- réalisée par une **structure animatrice**



- Origine de Natura 2000
- Textes fondateurs
- Réseau Natura 2000
- Terminologie
- Habitats et espèces en région Centre
- Mise en œuvre de Natura 2000 à l'échelle d'un site
- **Acteurs impliqués**

DREAL Centre : → Coordination régionale sur Natura 2000

→ Soutien administratif et technique aux opérateurs / animateurs

→ Accompagnement financier (élaboration ou suivi docob)

→ **Expertise / Connaissance technique**

DDT :

→ **Avis sur les évaluations des incidences**
→ Instruction des contrats / Maet / chartes

2000

→ **Coordination départementale sur Natura**

opérateurs / animateurs

→ Soutien administratif et technique aux

Structure

animatrice :

→ **Avis sur les évaluations des incidences**
→ Structure en charge de la mise en œuvre du docob

→ Structures variées : bureau d'études, association, établissement public, conservatoire...

→ **Relais d'information pour la connaissance du site**

Pour plus d'info...

▪ **Site Internet de la DREAL** : <http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr>,

Rubrique Eau, Nature /biodiversité

