




**PRÉFÈTE
COORDONNATRICE
DU BASSIN
LOIRE-BRETAGNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
De l'aménagement et du logement**

Bassin Loire-Bretagne

Bulletin de situation hydrologique mai 2025



Synthèse :

Le mois de mai a été plus sec que la moyenne sur la totalité du bassin.

Les débits des cours d'eau sont majoritairement bas pour la saison, sauf sur l'amont du bassin un peu plus arrosé.

Les niveaux des nappes sont toujours en baisse mais ils restent majoritairement hauts pour la saison.


Le suivi ONDE du mois de mai recense majoritairement des écoulements visibles sur les têtes de bassin versant

Les premières restrictions sécheresse ont été prises sur 3 % du territoire du bassin Loire-Bretagne, majoritairement en alerte. Environ 17 % du territoire est en vigilance.

1 Situation

1.1 Pluviométrie

Le bassin Loire-Bretagne est soumis à différent type de climat : océanique, semi-continentale, voire continentale, et méditerranéenne sur son extrême amont sous influence des événements Cévenols. Ainsi, les précipitations sont habituellement hétérogènes sur ce territoire.



Les précipitations sur le nord du bassin Loire-Bretagne, sont moins importantes que sur le sud.


Pourtant les précipitations sur l'ensemble du bassin sont inférieures aux moyennes de saison (–50 % globalement).

1.2 Cours d'eau

L'hydraulicité d'un cours d'eau est le rapport de son débit mensuel comparé à sa moyenne mensuelle interannuelle. (Exemple : si l'hydraulicité est égale à 0,3 cela veut dire que le débit mensuel mesuré est égal à 30% de la valeur moyenne habituelle.)

Les moyennes mensuelles interannuelles sont calculées sur des plages de données différentes selon les stations (dépendent de la plage de données disponible). Il est donc peu opportun de comparer les stations entre elles.

La carte ci-dessous nous informe de la situation à chaque station, en moyenne sur le mois.



Les débits du mois de mai sont inférieurs, voire très inférieurs, aux moyennes de saison, sauf sur l'amont du bassin où les débits restent dans la moyenne.

L'observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages estivaux et d'être un outil d'aide à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de bassin versant pour apporter de l'information sur les situations hydrographiques non couvertes par d'autres dispositifs existants.


Sur le terrain, le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon trois modalités de perturbations d'écoulement :

- « écoulement visible » : correspond à une station présentant un écoulement continu – écoulement permanent et visible à l'œil nu,
- « écoulement non visible » : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul,
- « assec » : correspondant à une station à sac, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.


Le réseau ONDE s'organise selon deux types de suivis : un suivi usuel et un suivi complémentaire.

Le suivi usuel vise à répondre à l'objectif de constitution d'un réseau de connaissance. Les observations usuelles sont stables dans le temps de manière à constituer un jeu de données historiques permettant l'estimation de l'intensité des étiages estivaux par comparaison des informations obtenues avec celles des années antérieures. Le suivi usuel est réalisé mensuellement sur la période de mai à septembre.

Ci-après la carte du suivi usuel du mois de mai, la grande majorité des cours d'eau suivis sont en écoulement visible.




Fin mai 2025, six cours d'eau sont observés en assec et six autres en rupture d'écoulement. Cette situation s'apparente à celle observée en 2018 et 2021.



Le bulletin OFB concernant le bassin Loire-Bretagne est disponible en téléchargement sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire pour plus d'information.

1.3 Nappes

La carte ci-dessous présente les niveaux et les tendances des nappes du bassin. Les indicateurs présentés sont généralement des combinaisons de piézomètres. Leur niveau résulte de la moyenne des niveaux des stations qui les composent.




Les niveaux sont en baisse pour la majorité des nappes du bassin signe que le déstockage, qui avait déjà commencé en mars, continu. Les niveaux sont plutôt hétérogènes avec une majorité de nappes dans la moyenne ou supérieur à celle-ci.

1.4 Remplissage des retenues

Le niveau de remplissage des barrages donne une information sur l'état des réserves en eau utilisées majoritairement pour l'alimentation en eau potable, le soutien d'étiage ou l'irrigation. Selon les courbes de gestion des différents barrages, ces niveaux peuvent être normaux ou non¹.

La carte ci-contre ne représente que les barrages les plus importants du bassin Loire-Bretagne, bien que de nombreux autres ouvrages existent.



Les barrages sont aujourd'hui majoritairement pleins.

2 Impacts sur les usages

Début juin environ 17 % du territoire du bassin est classé en vigilance sécheresse et moins de 3 % en alerte. Le Loiret a pris des restrictions du niveau de la crise sur une zone d'alerte.

¹ Par exemple un taux de remplissage de 30% peut paraître bas, mais si la courbe de gestion du barrage impose un remplissage de 30% le barrage est rempli au maximum de sa capacité du moment.

3 Pour aller plus loin

Les bulletins de situation :

- [Auvergne-Rhône-Alpes](#)
- [Bourgogne-Franche-Comté](#)
- [Bretagne](#)
- [Centre-Val de Loire](#)
- [Normandie](#)
- [Occitanie](#)
- [Pays de la Loire](#)

Les sites nationaux :

- [BRGM](#)
- [OiEau](#)
- [ONDE](#)
- [Hydroportail](#)
- [VigiEau](#)

Les sites des gestionnaires de barrage :

- [Établissement public Loire](#)
- [Vendée eau](#)