




**PRÉFÈTE
COORDONNATRICE
DU BASSIN
LOIRE-BRETAGNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
De l'aménagement et du logement**

Bassin Loire-Bretagne

Bulletin de situation hydrologique juillet 2025



Synthèse :

Le mois de juillet a été plus sec que la moyenne sur la totalité du bassin.

Les débits des cours d'eau sont majoritairement inférieurs, voire très inférieurs aux moyennes de saison.

Les niveaux des nappes sont toujours en baisse et sont contrastés entre d'une part les nappes réactives, plutôt basses et d'autre part les nappes inertielles du centre du bassin, plutôt hautes.

Le suivi ONDE du mois de juillet recense majoritairement des écoulements visibles sur les têtes de bassin versant, mais environ 20 % des cours d'eau suivis sont en assec ou en rupture d'écoulement.

Les restrictions sécheresse sont de plus en plus nombreuses avec 35 % du territoire en vigilance (contre 17 % début juin), 20 % en alerte (contre 3 % début juin), 22 % en alerte renforcée et enfin 10 % en crise.

1 Situation


1.1 Pluviométrie

Le bassin Loire-Bretagne est soumis à différents types de climat : océanique, semi-continentale, voire continentale, et méditerranéenne sur son extrême amont sous influence des événements cévenols. Ainsi, les précipitations sont habituellement hétérogènes sur ce territoire.


PRÉFÈTE
COORDONNATRICE
DU BASSIN
LOIRE-BRETAGNE

Direction régionale de l'environnement
de l'aménagement et du logement

Cumul des pluies sur le bassin Loire-Bretagne du 1er au 31 juillet 2025




Pendant le mois de juillet, quelques orages ont arrosé le bassin, plus particulièrement sur sa partie nord avec de cumuls pouvant atteindre localement les 150 mm. Le sud-est du département du Cher a été le secteur le moins arrosé avec des cumuls de pluie de seulement 35 mm. C'est également celui ayant le déficit par rapport à la normale mensuelle le plus important (de -50 à -75 %).

1.2 Cours d'eau

L'hydraulicité d'un cours d'eau est le rapport de son débit moyen mensuel comparé à sa moyenne mensuelle interannuelle. (Exemple : si l'hydraulicité est égale à 0,3 cela veut dire que le débit moyen mensuel mesuré est égal à 30% de la valeur moyenne habituelle des débits du mois considéré.)

Les moyennes mensuelles interannuelles sont calculées sur des plages de données différentes selon les stations (en fonction de la plage de données disponible). Il est donc peu opportun de comparer les stations entre elles.

La carte ci-dessous nous informe de la situation à chaque station, en moyenne sur le mois.



Les débits du mois de juillet sont inférieurs, voire très inférieurs, aux moyennes de saison sur une grande majorité du bassin, notamment sur l'amont du bassin et sur l'axe Loire.

L'observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages estivaux et d'être un outil d'aide à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de bassin versant pour apporter de l'information sur les situations hydrologiques non suivies par d'autres dispositifs existants.


Sur le terrain, le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon trois modalités de perturbations d'écoulement :

- « écoulement visible » : correspond à une station présentant un écoulement continu – écoulement permanent et visible à l'œil nu,
- « écoulement non visible » : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul,
- « assec » : correspondant à une station à sac, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.

Le réseau ONDE s'organise selon deux types de suivis : un suivi usuel et un suivi complémentaire.


Le suivi usuel vise à répondre à l'objectif de constitution d'un réseau de connaissance. Les observations usuelles sont stables dans le temps de manière à constituer un jeu de données historiques permettant l'estimation de l'intensité des étiages estivaux par comparaison des informations obtenues avec celles des années antérieures. Le suivi usuel est réalisé mensuellement sur la période de mai à septembre.

Ci-après la carte du suivi usuel du mois de juillet, la majorité (80 %) des cours d'eau suivi sont en écoulement visible, mais la situation s'est détériorée avec 125 cours d'eau (13 %) en assec et 65 cours d'eau (7 %) en rupture d'écoulement.



Grâce aux quelques pluies tombées fin juillet avant la campagne ONDE, la situation hydrologique des petits cours d'eau en tête de bassin versant se situe entre les années sèches 2019, 2022, 2023 et les années humides 2024 et 2021.


**Evolution des observations ONDE en rupture d'écoulement ou en assec fin juillet
entre 2012 et 2025 - Bassin Loire Bretagne**



Le bulletin OFB concernant le bassin Loire-Bretagne est disponible en téléchargement sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire pour plus d'information.

1.3 Nappes

La carte ci-dessous caractérise les niveaux des nappes du bassin et les tendances d'évolution de ceux-ci. Les indicateurs présentés sont généralement des combinaisons de piézomètres. Leurs niveaux résultent de la moyenne des niveaux des stations qui les composent.




Les couleurs de la légende ont été modifiées pour correspondre aux nouvelles couleurs utilisées par le BRGM. Vous trouverez plus d'information sur le [site du BRGM](#).

Les niveaux sont en baisse pour la majorité des nappes du bassin, signe que le déstockage continu. Les niveaux sont plutôt hétérogènes avec une majorité de nappes dans la moyenne ou inférieure à celle-ci. Dans le centre du bassin, les nappes inertielles comme la Beauce et la Craie sont plus hautes, allant jusqu'à des niveaux très hauts pour la saison.

1.4 Remplissage des retenues

Le niveau de remplissage des barrages donne une information sur l'état des réserves en eau utilisées majoritairement pour l'alimentation en eau potable, le soutien d'étiage ou l'irrigation. Selon les courbes de gestion des différents barrages, ces niveaux peuvent être normaux ou non¹.

La carte ci-contre ne représente que les barrages les plus importants du bassin Loire-Bretagne, bien que de nombreux autres ouvrages existent.



La grande majorité des barrages poursuivent leur déstockage. Les niveaux sont encore dans l'ensemble plutôt élevés dans cette première partie de l'été.

¹ Par exemple un taux de remplissage de 30% peut paraître bas, mais si la courbe de gestion du barrage impose un remplissage de 30% le barrage est rempli au maximum de sa capacité du moment.

2 Impacts sur les usages

Début août environ 35 % du territoire du bassin est classé en vigilance sécheresse, 20 % en alerte, 22 % en alerte renforcée et enfin 10 % en crise.

Avec la sécheresse qui s'aggrave du fait du déficit pluviométrique, le risque d'incendie est modéré sur la grande majorité du bassin.

3 Pour aller plus loin

Les bulletins de situation :

- [Auvergne-Rhône-Alpes](#)
- [Bourgogne-Franche-Comté](#)
- [Bretagne](#)
- [Centre-Val de Loire](#)
- [Normandie](#)
- [Occitanie](#)
- [Pays de la Loire](#)

Les sites nationaux :

- [BRGM](#)
- [OiEau](#)
- [ONDE](#)
- [Hydroportail](#)
- [VigiEau](#)

Les sites des gestionnaires de barrage :

- [Établissement public Loire](#)
- [Vendée eau](#)